**K. Bachas,
M. S. Centonze,
G. Chiodini,
A. Palazzo,
E. Schioppa,
S. Spagnolo**

Ricerca di nuova fisica attraverso la produzione risonante di ZV in $ll+jets$

- Canale studiato a Lecce sin dal 2015, per la ricerca di nuovi fenomeni nella produzione risonante di coppie di bosoni di gauge ZV (V=Z o W) con una Z ricostruita in ee oppure $\mu\mu$ e l'altro bosone (Z o W) in adroni
 - Risultati finali su tutta la statistica 2015 e 2016 pubblicati JHEP 03 (2018) 009, [ArXiv:1708.09638](#)
 - Combinati con risultati ATLAS da tutti i canali VV' , VH e anche ll per vincolare KK Graviton e risonanze pesanti nel modello HVT (heavy vector triplet) [Phys. Rev. D 98 \(2018\) 052008](#), [arXiv:1808.02380](#) (36 fb^{-1} a 13 TeV)
 - *Analisi di tutta la statistica del Run-2 (139 fb^{-1} a 13 TeV) sviluppata in ATL-COM-PHYS-2018-1549 (autori K.Bachas, G.Chiodini, S.Spagnolo + altri autori):*
 - **Publicata da ATLAS il 30 Aprile 2020** [ArXiv:2004.14636](#), sottomesso a EPJC
 - strategia di analisi rinnovata per guadagnare sensibilità
 - Lavoro trainante di K. Bachas su applicazione di Deep Neural Networks (discriminazione segnale/fondo) e Recurrent Neural Networks (categorizzazione modo di produzione) nella strategia in collaborazione con Napoli

Tre meccanismi di produzione

Tre modelli per l'interpretazione:

- 1) Spin 0: Radion (eccitazione scalare del campo gravitazionale in modelli Randall Sundrum)
- 2) Spin 1: nuovi bosoni di gauge in HVT
- 3) Spin 2: graviton in modelli Randall Sundrum

Tre canali: 0, 1 e 2 leptons

Ricerca di nuova fisica attraverso la produzione risonante di ZV in ll+jets

- Strategia di analisi:
 - Separazione di eventi **VBF** e non-VBF
 - RNN per classificazione VBF/ggF → recupera efficienza per il segnale VBF rispetto ad approccio cut-based; *attualmente adottato*
 - Fit per estrazione del segnale
 - DNN per classificazione Segnale/Bkg → investigato, utile, ma non adottato (sia nel caso VBF and ggF);
 - Fit dello spettro di massa invariante in regioni ad alta o bassa purezza, con due jet risolti o *merged*: $m_{\tau}(vvjj)$, $m(lvjj)$, $m(lljj)$, $m_{\tau}(vvJ)$, $m(lvJ)$, **$m(llJ)$**
 - Classificatori R/DNN basati su variabili cinematiche fondamentali

RNN:
Efficienza per VBF da 40% → 68%,
Efficienza per ggF da 93% a 86%

Miglioramento più spiccato ad alta massa

Ricerca di nuova fisica attraverso la produzione risonante di VV

I risultati in confronto con la pubblicazione a statistica parziale

[ArXiv:1708.09638](https://arxiv.org/abs/1708.09638)

[ArXiv:2004.14636](https://arxiv.org/abs/2004.14636)

Table 5: Observed (expected) 95% CL lower limits on the mass, in TeV, of different resonances in the benchmark models studied. The symbol “-” means no limit is set.

Production process	RS radion	HVT		RS graviton	
		W'	Z'		
ggF/DY	3.2 (2.9)	Model A	3.9 (3.8)	3.5 (3.4)	2.0 (2.2)
		Model B	4.3 (4.0)	3.9 (3.7)	
VBF	-	Model C	-	-	0.76 (0.77)

I limiti sui modelli di benchmark:
 dopo la combinazione con il
 canale WW

Ricerca di nuova fisica attraverso la produzione risonante di VV

- Prospettive in attesa dei dati del Run-3: pubblicazione basata sugli stessi dati e varie novità tecniche (esplorare al meglio le informazioni nascoste nei dati, raffinare e generalizzare le interpretazioni)
 - L'uso di una Deep Neural Network *parametrica*, per la discriminazione segnale fondo - migliore sensibilità dimostrata, importante consolidare il metodo, attraverso una pubblicazione che ne ratifichi il vaglio completo
 - Enrico J.S. e Martino C. hanno già intrapreso questa strada e altri gruppi hanno espresso interesse a finalizzare l'applicazione della pDNN all'analisi
 - Nuove interpretazioni più generali: Effective field theory, per esempio
 - Varie altre possibilità di miglioramenti:
 - Curare la bassa efficienza per $Z \rightarrow ee$ ad alto p_T , dovuta alla sovrapposizione degli sciami di elettroni
 - Recente kick-off meeting organizzativo in cui abbiamo espresso interesse a contribuire

Flavour tagging in ATLAS: performance di algoritmi per la fisica

- La discriminazione di jet da quark b, da jet da quark charm o light ha un peso crescente nella fisica di ATLAS
 - Il goal di fisica primario (di verifica di precisione del Modello Standard) di HL-LHC è la misura dell'accoppiamento trilineare del bosone di Higgs, esplorabile attraverso la ricerca di produzione di coppie di Higgs
 - I canali più sensibili finora (e nel futuro) sono bbbb, bb $\tau\tau$ e bbyy
 - Tutti canali in cui l'efficienza e la purezza della selezione dipende in modo critico dalla performance del *b-tagging*
- L'attività del working group di Flavour-tagging è frenetica:
 - pubblicazione sugli algoritmi e le performance del b-tagging sui dati del Run-2 (2015-17) è dell'estate 2019;
 - Già ulteriori upgrade degli algoritmi hanno migliorato la performance in modo importante per la fisica => raccomandazione finale per le analisi future sulla statistica del Run-2
 - La performance dipende da un primo passo cruciale che non è stato rivisitato nonostante i veloci aggiornamenti degli algoritmi:
 - La scelta delle tracce da associare al jet su cui applicare gli algoritmi di flavour tagging
 - Qualification Task di Martino Centonze, dottorando del XXXV ciclo:
 - Studio/ottimizzazione degli algoritmi di associazione di traccia in input al b-tagging

Flavour tagging in ATLAS: performance di algoritmi per la fisica

- Martino C. ha una borsa di PhD industriale su tecniche di Machine Learning nell'analisi di dati in ATLAS e nella ricerca applicata
 - In partnership con University College London (esperti di b-tagging e tracciamento in condizioni ad alto pileup) e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (data analytics in settori vari)
- Il Flavor tagging è l'area di ATLAS in cui il Machine Learning è usato in modo più pesante e di routine
 - Un ambito di lavoro di performance eccellente per il progetto di Martino e una palestra delle metodologie che stanno invadendo il dominio dell'analisi
 - Spazio per contributi anche per altre persone del gruppo
 - B-tagging è la problematica di ricostruzione di oggetti fisici di alto livello più affine al rivelatore di tracciamento di maggior precisione: il rivelatore a pixel
 - Si intende nel tempo accompagnare all'attività sul detector a pixel (di upgrade per HL-LHC), quella relativa a studi di performance e sviluppo di algoritmi
- A. Palazzo, laureanda magistrale, colloca le misure di caratterizzazione del chip di lettura per i pixel di ATLAS in HL-LHC, nel contesto del miglioramento della performance di b-tagging per la fisica del run di alta luminosità

Basati su performance del b-tagging 2017

Physics

- Editorial Boards:
 - K. Bachas: J/ ψ production and jet substructure (BPHY-2017-03)
- Altro:
 - S. Spagnolo componente del ATLAS Publication Committee da Marzo 2018 a Febbraio 2020